



OligoSTART

NAWÓZ DOLISTNY WSPIERAJĄCY METABOLIZM MŁODYCH ROŚLIN

Wysoko skoncentrowany nawóz dolistny zawierający trzy najważniejsze mikroelementy dla wszystkich upraw: mangan, miedź i cynk. Mikroelementy są w pełni wykorzystywane ze względu na ich małą mobilność w roślinie po zastosowaniu we wczesnych stadiach rozwoju.

KORZYŚCI

- ▶ Usuwa niedobory Cu, Mn i Zn oraz zapobiega występowaniu niedoborów, zwłaszcza w uprawach o wysokim potencjale plonowania.
- ▶ Lepsze wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych.
- ▶ Optymalizuje wzrost i zdrowotność roślin, zwłaszcza we wczesnych stadiach wzrostu na glebach o niskim odczynie pH.
- ▶ Łagodzi stres roślin wywołany przez niekorzystne warunki środowiska, herbicydy i po uszkodzeniach mechanicznych.

REKOMENDOWANE DAWKI

Uprawa	Termin Stosowania i dawka
Zboża	Jesień: faza 3–4 liści 0,5 l/ha Wiosna: krzewienie 0,5–1 l/ha Wiosna: liść flagowy 0,5 l/ha
Rzepak	Jesień: faza 4–5 liści 0,5 l/ha + bor Wiosna: po ruszeniu vegetacji 0,5–1 l/ha + bor Wiosna: na zwarty zielony pąk kwiatowy 0,5 l/ha + bor
Kukurydza	Od 3 do 6 liści 0,5 l/ha + cynk Od 6 do 8 liści 0,5 l/ha + cynk
Burak	Od 6 do 8 liści 1 l/ha + bor Zwarcie międzyrzędzi 1 l/ha + bor
Ziemniak	Po zwarcu roślin w rzędzie 1–1,5 l/ha Przed kwitnieniem 1–1,5 l/ha

SKŁAD: Cu 6,1 % (110 g/l), Mn 18,3 % (330 g/l), Zn 4,6 % (84 g/l)
GĘSTOŚĆ WŁAŚCIWA: 1,74 kg/l

Mangan

- ▶ Uczestniczy w tworzeniu chlorofilu i ma bezpośredni wpływ na intensywność fotosyntezy.
- ▶ Uczestniczy w biosyntezie kwasów tłuszczowych.
- ▶ Sterując przemianą węglowodanów wpływa na gospodarkę energetyczną roślin.
- ▶ Umożliwia redukcję azotanów.
- ▶ Wspiera wzrost korzeni bocznych.
- ▶ Wpływa na przyrost komórki na długość, przez co aktywuje wzrost rośliny.

Miedź

- ▶ Kontroluje metabolizm azotu w roślinie.
- ▶ Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
- ▶ Stymuluje krzewienie.
- ▶ Zapobiega redukcji źdźbeł kłosośnych.
- ▶ Steruje fotosyntetycznym transportem elektronów.
- ▶ Bierze udział w procesie powstawania ligniny.
- ▶ Kontroluje przemieszczanie azotu ze słomy do tworzących się ziarniaków.
- ▶ Poprawia zdrowotność łanu.
- ▶ Uczestniczy w kształtowaniu bakterii brodawkowych roślin bobowatych.


Cynk

- ▶ Ma wpływ na przyswajanie oraz metabolizm azotu.
- ▶ Wpływa na odporność roślin na susze i choroby.
- ▶ Poprawia mrozoodporność.
- ▶ Cynk korzystnie wpływa na zawartość białka i cukru w ziarnie.
- ▶ Wpływa na poziom kwasu indolooctowego, który jest hormonem wzrostu w roślinach.
- ▶ Wpływa na powstawanie białek.


REKOMENDACJE

OligoSTART może być stosowany łącznie z fungycydami i insektycydami w mieszaninach zbiornikowych. Nie zaleca się stosowania z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.

ZBOŻA OZIME I JARE



KUKURYDZA



ZIEMNIAKI

