

SEPTORIOZA
PASKOWANA
LIŚCI I KŁOSA

BRUNATNA
PLAMISTOŚĆ
I RDZE

MAĆZNIK
PRAWDZIWY

ZGNILIZNA
TWARDZIKOWA

CZERŃ
KRZYŻOWYCH

AzoGUARD

SKUTECZNIE ZWALCZA NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY


Fungicyd o długotrwałym i szerokim spektrum działania z grupy strobiluryn mający na celu ochronę pszenicy i jęczmienia przed chorobami liści i kłosa oraz rzepaku, kukurydzy, ziemniaka i warzyw.

KORZYŚCI

- ▶ Szerokie spektrum zwalczanych chorób i długi okres ochrony
- ▶ Działanie zapobiegawcze przez okres 3 do 8 tygodni.
- ▶ Idealny do mieszanin z triazolowymi fungicydami.
- ▶ Wyraźny efekt zieloności. Zwiększona intensywność fotosyntezy, lepsze wykorzystanie wody i azotu oraz wolniejsze starzenie się roślin.
- ▶ Większy plon o większej MTZ.
- ▶ Wysoka skuteczność w przypadku wszystkich głównych chorób liści i kłosa u zbóż: rdza, septorioza, mączniak, fuzarioza.
- ▶ Zmniejsza pojawianie się brązowych końcówek na jęczmieniu browarnym.
- ▶ Ma znakomity efekt w rzepaku przeciwko zgniliznie twardzikowej i czerni krzyżowych.
- ▶ Ma istotny wtórny wpływ na szarą pleśń.

Substancja aktywna: azoksystrobina 250 g/l


Formulacja: płynny koncentrat zawiesinowy (SC) do rozcieńczania z wodą



Septorioza paskowana liści



Plamistość siatkowa jęczmienia



Rdza zbożowa



Rynchosporioza zbóż



Septorioza plew



Mączniak prawdziwy zbóż i traw



Zgnilizna twardzikowa




Czerń krzyżowych


ZALECENIA DO STOSOWANIA

Uprawa	Choroba	Zarejestrowana dawka i liczba aplikacji	Zalecenia i uwagi
Pszenica	Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów	Do 1 l/ha, 2× w sezonie wegetacyjnym	Stosujemy zapobiegawczo lub na początku wystąpienia objawów. W celu poprawy skuteczności i zapewnienia efektu interwencyjnego zalecamy połączenie AzoGUARD 0,4–0,5 l/ha + epoksykonazol 0,4–0,6 l/ha lub tebukonazol 0,7 l/ha. Termin stosowania od początku strzelania w źdźbło do końca kwitnienia (BBCH 31–69). Wykonać można dwa zabiegi w odstępach 14–28 dni. Wczesną wiosną w celu regeneracji po zimie zaleca się zastosowanie CereaSTART 2 l/ha. Zaleca się łączne stosowanie razem z nawozem dolistnym NitroTOP 5–10 l/ha w celu lepszego wykorzystania efektu zieloności bez ryzyka przypalnia liści.
Jęczmień	Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż	Do 1 l/ha, 2× w sezonie wegetacyjnym	Stosujemy zapobiegawczo lub na początku wystąpienia objawów. W celu poprawy skuteczności i zapewnienia efektu interwencyjnego zalecamy połączenie AzoGUARD 0,4–0,5 l/ha + epoksykonazol 0,4–0,6 l/ha lub tebukonazol 0,6–0,7 l/ha. Termin stosowania od początku strzelania w źdźbło do końca krzewienia (BBCH 31–59). W odmianach browarnych zabieg wykonujemy na początku strzelania w źdźbło nie dopuszczając do silnej presji chorób. Wykonać można dwa zabiegi w odstępach 12–21 dni. Razem z regulatorami wzrostu (BBCH 31–39) zalecamy zastosowanie OligoSTART 0,5 l/ha z nawozem CereaSTART 1,5–2 l/ha w celu lepszego odżywienia roślin. W okresach suszy zastosowanie fungicydów strobilurynowych w fazie do liścia flagowego przedłużają wegetację i eliminują ryzyko przedwczesnego starzenia się tkanek. Wcześnie dojrzewające rośliny charakteryzują się drobnym ziarnem o wyższej zawartości białka.
Rzepak ozimy	Czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustych, zgnilizna twardzikowa	Do 1 l/ha, 1× w sezonie wegetacyjnym	Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów czerni krzyżowych lub zgnilizny twardzikowej od początku do końca fazy kwitnienia, najlepiej w momencie pierwszych spadających płatków (BBCH 61–69). Można stosować łącznie z insektycydami. Jednocześnie zaleca się dodanie płynnego nawozu dolistnego OilSTART 3–5 l/ha gdyż rośliny niedostatecznie zaopatrzone w siarkę słabiej kwitną, zawiązują łuszczyzny z mniejszą liczbą nasion lub łuszczyzny są puste.

JĘCZMIEŃ I PSZENICA



RZEPAK OZIMY



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.