

KaliumTOP

NAWÓZ WE

TYP: C.2.11 – Roztwór nawozu azotowo potasowego NK 3-32



Skład	Zawartość %	Zawartość	Waga netto	
Azot-łącznie (N)	3 %	46 g/l	15,3 Kg	10 L
Rozpuszczalny w wodzie tlenek Potasu (K ₂ O)	32 %	500 g/l		



soufflet
aGRO

KaliumTOP



OSTRZEŻENIE

Zawiera **POTASSIUM CARBONATE**

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P102 Chronić przed dziećmi.

P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P310 Natychmiast skontaktować się z **OŚRODKIEM ZATRUĆ** lub lekarzem.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami.

Zawartość / pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji.

ZALECENIA STOSOWANIA W celu uzyskania optymalnego efektu należy stosować odpowiednią ilość wody, która pozwoli na pokrycie całej rośliny. Należy unikać wykonywania zabiegów w czasie silnego nasłonecznienia i / lub wysokich temperatur. Jeśli to możliwe zabieg należy wykonać wieczorem lub wcześniej rano, szczególnie gdy spodziewane są temperatury przekraczające 25 °C w ciągu dnia. W przypadku roślin w wczesnym stadium rozwoju, w warunkach stresowych należy przyjąć zmniejszone dawki.

Należy przestrzegać dawek i terminów stosowania zawartych w etykiecie dla poszczególnych upraw. Do używania na wolnym powietrzu.

ZALECENE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Uprawy	Dawka	Termin zabiegu
Zboża	1–2 l/ha w min 250L wody	Jesienią – początek krzewienia
Rzepak		Jesienią, w fazie 4–6 liści
Buraki		3 do 5 zabiegów na dobrze rozwiniętych liściach
Ziemniaki		3 do 5 zabiegów na dobrze rozwiniętych liściach
Drzewa i krzewy owocowe		4–6 zabiegów w odstępach 10–15 dniowych od początku dojrzewania owoców do 2 tygodni przed zbiorem
Warzywa, pomidory, ogórki		2 zabiegi od momentu dojrzewania owoców

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIECZY ROBOCZEJ

1 Napełnić zbiornik opryskiwacza połową wymaganej ilości i włączyć mieszadło. 2 Dobrze wstrząsnąć opakowaniem i dodać odpowiednią ilość nawozu do opryskiwacza. Uzupełnić zbiornik wodą do pełnej ilości, cały czas mieszając. 3 Po zakończeniu z abiegu aparaturę dokładnie umyć.

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku rozlania nawozu miejsca zanieczyszczone przemyć dużą ilością wody. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

UTYLIZACJA

Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób. Unikać uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wypłukać trzykrotnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów.

ZASTRZEŻENIE

Producent i sprzedawcy tego produktu gwarantują, że preparat zawiera określone składniki aktywne w określonych ilościach po zapakowaniu. Nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikające z przechowywania, obsługi, stosowania lub użytkowania tego produktu.



Data produkcji: na opakowaniu

Okres ważności: 2 lata • **Nr partii:** na opakowaniu

Dystrybutor: SOUFFLET AGRO, POLSKA SP. Z O. O.,
ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań, tel. +48 616 501 096

Producent: AGRONUTRITION,

Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France